

Posologie

Argent colloïdal

Absorption orale

En prévention : 1 à 2 cuillère à thé le matin à jeun, si possible 15 à 30 minutes avant le repas, et une autre dose similaire le soir avant le coucher.

En cas de maladie : 2 cuillères à table le matin à jeun et 2 autres le soir. On peut étaler la dose en incluant le midi.

Enfants : Il faut réduire de moitié la dose destinée au enfants comme c'est l'usage, la norme la plus répandue.

Méthode d'absorption : Avant d'avaler, il est fortement conseillé de laisser l'argent colloïdal sous la langue quelques minutes, afin que les ions et particules passent au travers des capillaires pour se rendre directement dans le système sanguin évitant ainsi de passer dans tout le système digestif.

Application topique

À l'aide d'une pipette on peut mettre la solution d'argent sur la peau pour désinfecter les brûlures ou blessures ainsi que dans le nez, les yeux ou oreilles pour contrer différentes infections.

Recommandation pour les maux de gorge

Prenez une cuillère à table de solution d'argent colloïdal que vous gardé dans la bouche ou laissez tomber plusieurs gouttes dans votre gorge grâce à une pipette. Couchez vous ensuite sur le dos en essayant de garder la solution dans le fond de la gorge le plus longtemps possible (sans s'étouffer!) afin de la mettre en contact directement avec les agents infectieux présents sur place. On peut avaler la solution par la suite.

Recommandation pour les sinusites /allergies

Se coucher sur le dos en tournant un peu la tête pour aligner la ou les narines affectées afin de recevoir quelques gouttes avec la pipette. Il faut alors se relever un peu afin de garder les gouttes dans les sinus en trouvant la bonne position pour que les gouttes ne tombent ni dans le fond de la gorge ni ne sortent du nez OU vous pouvez renifler fort en bouchant l'autre narine afin de faire entrer la solution plus profondément dans les sinus. Vous pouvez recommencer plusieurs fois.

Pour plus d'informations aller sur <http://labo.versatiles.biz>

Dosage

Colloidal Silver

Oral Absorption

Prevention : 1 to 2 teaspoons in the morning on an empty stomach, if possible 15 to 30 minutes before meals, and another similar dose in the evening before bedtime.

In case of illness : 2 tablespoons in the morning on an empty stomach and 2 others in the evening. The dose can be spread by including the noon.

Children : It is necessary to reduce by half the dose intended for children as is the practice, the most prevalent standard.

Absorption method : Before swallowing, it is strongly advised to leave the colloidal silver under the tongue for a few minutes, so that the ions and particles pass through the capillaries to go directly into the bloodstream thus avoiding passing through the entire digestive system.

Topical application

Using a pipette you can put the silver solution on the skin to disinfect the burns or injuries as well as in the nose, eyes or ears to counter different infections.

Recommendation for sore throat

Take a spoonful of colloidal silver solution that you keep in your mouth or drop several drops in your throat through a pipette. Lay on your back trying to keep the solution in the bottom of the throat as long as possible (without choking!) In order to put it directly in contact with the infectious agents present on the spot. The solution can be swallowed thereafter.

Recommendation for sinusitis / allergies

Lie on your back by turning your head a little to align the affected nostril (s) to receive a few drops with the pipette. It is then necessary to rise a little so as to keep the drops in the sinuses by finding the right position so that the drops do not fall in the bottom of the throat nor come out of the nose OR you can sniff strong by closing the other nostril so to bring the solution more deeply into the sinuses. You can start over again.

For more information go to <http://labo.versatiles.biz>

The web site is in French. You can use the Google Translate Web tool to easily navigate the website in English - <http://itools.com/tool/google-translate-web-page-translator>